



Determination Of the Role of Oxygen in AMI

Inklusionskriterier:

1: Patient med symtom som ni enligt behandlingsriktlinjerna skall sända EKG på.

2: SpO₂ ≥ 90%

3: Patient skall ha fyllt 30 år

4: Avvakta med syrgas om patienten uppfyller kriterierna

Exklusionskriterier:

1: Ovilja att delta

2: Oförmåga att förstå information

3: Pågående långtidsbehandling med syrgas

4: SpO₂ < 90%, ålder < 30år

5: Hjärtstopp innan randomiseringen

- Sänd EKG och avvakta HIA kontakt/ meddelande eller samtal. Om patienten kan ingå i studien kommer han/hon randomiseras till syrgasbehandling eller ingen syrgasbehandling. Ge muntlig information enligt separat dokument. Vid positivt medgivande att delta i studien dokumentera i CRF.
- Om patienten inte inkluderas prehospitalt kan inklusion ske på akuten senare. Följ då gällande behandlingsriktlinjer.

Om patienten randomiseras till syrgasbehandling skall det vara minst 6 l/min på mask.

- Vid avlämning på akuten rapportera att patienten inte fått syrgas pga möjligheten till inkludering senare på akuten. Om patient inkluderats i ambulansen, fyll i CRF som följer patient.